

国際前立腺症状スコア (I-PSS)

この1ヶ月の間に	全くない	まれに	たまに	ときどき	しばしば	ほとんどいつも
		5回に1回の割合より少ない	2回に1回の割合より少ない	2回に1回の割合くらい	2回に1回の割合より多い	
おしっこをした後、まだ尿が残っている感じがありましたか？	0点	1点	2点	3点	4点	5点
おしっこをした後、2時間以内にもう一度しなくてはならないことがありましたか？	0点	1点	2点	3点	4点	5点
おしっこをしている間に尿が何度もとぎれることがありましたか？	0点	1点	2点	3点	4点	5点
尿意を我慢することが難しいことがありましたか？	0点	1点	2点	3点	4点	5点
おしっこの勢いが弱いことがありましたか？	0点	1点	2点	3点	4点	5点
おしっこをし始めるためにお腹に力を入れることがありましたか？	0点	1点	2点	3点	4点	5点
夜寝てから朝起きるまでに、ふつう何回おしっこをするために起きますか？	0回	1回	2回	3回	4回	5回
	0点	1点	2点	3点	4点	5点

(I-PSSを一部改変)

上記の合計点数

点

QOLスコア

現在のおしっこの状態がこのまま続くとしたらどう思いますか？	とても満足	満足	ほぼ満足	なんともいえない	やや不満	いやだ	とてもいやだ
	0点	1点	2点	3点	4点	5点	6点

(QOLスコアを一部改変)

問診で自覚症状の程度がわかると、前立腺や膀胱、尿道の状態を調べる検査が行われます。